



Büte



Frucht



Reife Frucht



Herbstfärbung

## Asimina triloba – Dreilappiger Paupau oder Indianerbanane

### Sorten- und Kulturhinweise

An der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim werden 5 Sorten der exotischen, in Nordamerika beheimateten Baumobstart geprüft.

In den ersten 5 Jahren ist das Wachstum sehr langsam. Die robusten Bäume, die am Ende des 9. Standjahres je nach Sorte 3 bis 4 m hoch und 1,70 bis 2,20 m breit gewachsen sind, haben 2003 Fröste bis  $-26^{\circ}\text{C}$  problemlos überstanden.

Pflanzenschutzmaßnahmen sind keine erforderlich.

Die Blüte erscheint im Mai am zwei- und mehrjährigen Holz. Asimina-Sorten sind überwiegend selbst steril, sodass eine weitere Sorte einbezogen werden muss. Die Sorte „Sunflower“ gilt als selbstfruchtbar.

Die Ernte beginnt Ende September.

Verzehrt werden die Früchte ohne Schale durch Auslöffeln (ähnlich Kiwi). Die Samen sind bohnenkerngroß. Die Frucht schmeckt süß-aromatisch ähnlich wie ein Mix aus Banane/Mango/Melone.

Als beste Sorten erweisen sich „Sunflower“ und „Overleese“.

Schnitt- und Formierungseingriffe sind kaum erforderlich.

Quelle: Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Würzburg/Veitshöchheim

Autor: Hubert Siegler